Théorème de la bijection : Soit f une fonction continue strictement monotone (on traitera ici strictement croissante) sur $[a; b]$ et k un nombre appartenant à $[f(a); f(b)]$. Alors, l'équation $f(x) = k$ **admet une solution unique** sur $[a; b]$

L'idée de la démonstration est de trouver deux suites adjacentes (a_n) et (b_n) telles que $f(a_n) \leq k \leq f(b_n)$. On aura alors l'assurance de l'existence d'une limite c commune aux deux suites. Nous montrerons alors que $f(c) = k$ et que de plus, la fonction étant strictement monotone, ce nombre est unique.

1. Recherche des deux suites

L'idée est la suivante,

★ Cas n°1 : Soit $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq k$ (cas du schéma) et on peut considérer que $\frac{a+b}{2}$ comme nouvelle borne supérieure (qui jouera le rôle que jouait b)

★ Cas n°2 : Soit à l'inverse $f\left(\frac{a+b}{2}\right) < k$ et $\frac{a+b}{2}$ joue cette fois le rôle que jouait a .

On peut répéter ce processus à l'infini, l'amplitude de l'intervalle étant à chaque fois divisée par 2.

Les suites sont donc définies par :

$a_0 = a$ et $b_0 = b$. et :

$$\begin{aligned} \star \text{ Cas n}^\circ 1 : & \text{ Si } f\left(\frac{a_n + b_n}{2}\right) \geq k, \text{ alors } \begin{cases} a_{n+1} = a_n \\ b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \end{cases} \\ \star \text{ Cas n}^\circ 2 : & \text{ Si } f\left(\frac{a_n + b_n}{2}\right) < k, \text{ alors } \begin{cases} a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \\ b_{n+1} = b_n \end{cases} \end{aligned}$$

On va alors montrer successivement que :

1. $\forall n \in \mathbb{N}, a_n < b_n$
2. (a_n) est une suite croissante et (b_n) une suite décroissante
3. $(b_n - a_n)$ est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$ donc convergente vers 0.
4. $\forall n \in \mathbb{N}, f(a_n) \leq k \leq f(b_n)$

Il ne reste plus qu'à conclure à l'existence de c .

Dans un deuxième temps, on montrera l'unicité de c comme conséquence de la stricte monotonie de f .

1. Par récurrence : Soit $(P_n) : b_n - a_n > 0$.

1.1. Initialisation $a < b \Rightarrow b_0 - a_0 > 0$. La propriété est vraie à l'ordre 0.

1.2. Hérédité : supposons (P_n) vraie, c'est à dire $b_n - a_n > 0$.

★ Cas n°1 : Si $f\left(\frac{a_n + b_n}{2}\right) \geq k$, alors $b_{n+1} - a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} - a_n$ donc $b_{n+1} - a_{n+1} = \frac{b_n - a_n}{2} > 0$ (hyp de récurrence)

★ Cas n°2 : Si $f\left(\frac{a_n + b_n}{2}\right) < k$, alors $b_{n+1} - a_{n+1} = b_n - \frac{a_n + b_n}{2}$ donc $b_{n+1} - a_{n+1} = \frac{b_n - a_n}{2} > 0$

Ainsi, dans les deux seuls cas possibles, supposant (P_n) vraie, on montre que (P_{n+1}) l'est aussi. Elle est vraie pour tout entier $n \geq 0$.

2. (a_n) est une suite croissante

★ Cas n°1 : $a_{n+1} - a_n = 0$

★ Cas n°2 : $a_{n+1} - a_n = \frac{a_n + b_n}{2} - a_n = \frac{b_n - a_n}{2}$ et $b_n - a_n > 0$ d'après ce qui précède.

Donc dans les deux cas, $a_{n+1} - a_n \geq 0$

La démonstration de (b_n) décroissante est rigoureusement identique.

3. On a établi dans le 1. que $b_{n+1} - a_{n+1} = \frac{b_n - a_n}{2}$ qui est bien la traduction de $(b_n - a_n)$ géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

La raison étant dans $]-1; 1[$ la suite converge vers 0.

On a donc (a_n) croissante, (b_n) décroissante et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (b_n - a_n) = 0$. Les suites sont donc adjacentes et convergent vers la même limite c .

4. Cette propriété découle directement du mode de construction des deux suites. Démontrons là par récurrence.

Soit $(P_n) : f(a_n) \leq k \leq f(b_n)$

4.1. Initialisation : $f(a) \leq k \leq f(b) \Rightarrow f(a_0) \leq k \leq f(b_0)$ donc P_0 est vraie.

4.2. Hérédité : Supposons que P_n est vraie. c'est à dire $f(a_n) \leq k \leq f(b_n)$ Alors,

★ Cas n°1 : $\begin{cases} a_{n+1} = a_n \\ f(a_n) \leq k \end{cases} \Rightarrow f(a_{n+1}) \leq k$

et la condition du Cas n°1 est $f\left(\frac{a_n + b_n}{2}\right) \geq k \Rightarrow f(b_{n+1}) \geq k$ puisque $b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$

★ Cas n°2 : $\begin{cases} b_{n+1} = b_n \\ f(b_n) \geq k \end{cases} \Rightarrow f(b_{n+1}) \geq k$

et la condition du Cas n°1 est $f\left(\frac{a_n + b_n}{2}\right) < k \Rightarrow f(a_{n+1}) < k \Rightarrow f(a_{n+1}) \leq k$ puisque $a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$

On a donc bien dans les deux cas, $f(a_{n+1}) \leq k \leq f(b_{n+1})$ donc P_{n+1} est vraie.

Par récurrence, P_n est vraie pour tout $n \geq 0$.

Conclusion :

$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = c \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = f(c)$ puisque f est continue. De même $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(b_n) = f(c)$

Or $\forall n \in \mathbb{N}, f(a_n) \leq k \leq f(b_n) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) \leq k \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} f(b_n)$ (théorèmes généraux des limites)

Donc $f(c) \leq k \leq f(c) \Rightarrow \boxed{k = f(c)}$

Il ne reste plus qu'à prouver l'**unicité** de c comme conséquence de la stricte monotonie de f .

Supposons en effet qu'il existe un deuxième c' différent de c . Par exemple $c' < c$.

Alors, f étant strictement croissante, $c' < c \Rightarrow f(c') < f(c)$, donc $f(c') < k$ donc $f(c') \neq k$.

Par l'absurde, c' ne peut exister et c est unique.